


















| Katalog rostlin – trvalky, okrasné trávy | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|------|-----------------|-----------|--|
| trvalky | | | | | | | | | | | | | | |
| název latinsky | název česky | způsob množení, gen/veg | výška v době květu (cm) | Převládající barva květu | barva květu | dobu květu | nároky na světlo (s- slunce, p-polostín, t- tmavý stín) | stanovištní okruh | léčivá, aromatická | láká včely a motýly | voní | k řezu, do vázy | ks/ m2 | Poznámka, použití |
| Acaena microphylla Kupferteppich | plazilka, bedrnička | veg | 5 | | do červena | VII.-VII. | S-p | FS, M, Fr2 | | | | | 8 | Bronzově červený list, výborný kryt půdy, na okraj záhonu, do skalky, náhrada trávníku |
| Acanthus hungaricus | paznehtník | gen | 80 | | purpu- vo-bílá | VII.-IX. | S-p | FR2, ST2, FS2,GR2 | | | | řez | s-5 | výrazná solitera nebo do skupin, podrost v polostínu, pozdě raší |
| Aconitum carmichaeli Arendsii | oměj | | 100 | | modrý | IX.-X. | p | G2, GR2, FR2 | | | | řez | 5-7 | Pozdě a dlouho a výrazně kvetoucí trvalka. Snáší přistínění. |
| Agastache aurantiaca-hybr. Tango | agastache | | 35 | | oranžov- ý | VI.-X. | s | | | an o | | řez | | krátkověká, nespolehlivá |
| Agastache foeniculum | agastache | gen | 0,7 | | modrofí- alový | 7-9 | s | | ano | | | | | |
| Agastache foeniculum Golden Jubilee | agastache anýzová | gen | 50 | | modrofí- alová | VII.-IX. | s | B1 | ano | an o | | | 8 | žlutý list, pro slunečné stanoviště – zajímavá barva listu a vůně |
| Achillea millefolium Cerise Queen | řebříček obecný | gen | 60 | | růžový, bílý | 6-8 | | | | | | | | |
| Ajuga reptans Alba | zběhovec | veg | 25 | | bílý | 5-6 | p | GR2-3, Fr2-3 | | | | | | kryt půdy ve stínu, podrost stromů, |
| Ajuga reptans Palisander | zběhovec | veg | 25 | | modrá | IV.- V. | P-t | GR2-3, Fr2-3 | | an o | | | 12 | Tmavě červený list , kryt půdy ve stínu, podrost stromů, |
| Alcea rosea plena Chaters Purple | | gen | 180 | | tmavěč- ervený | 6-9 | | | | | | | | výrazná solitera |
| Alchemilla mollis | kontryhel měkký | gen | 30 | | žlutý | 6.-7. | S-p | Fr2-3, GR2-3 | ano | | | řez | 5 | podrost, k řezu |
| Allium angulosum | | gen | 50 | | růžový | 7-9 | s | Fr2-3, GR2-3 | ano | | | | | Na Sibiři se používá jako zelenina. List podobný okrasným travám, dlouhou dobu svěží. Domácí druh. |
| Allium fistulosum | cibule zimní, ošlejš | gen | 40 | | bílá | VI. | s | | ano | an o | | | 12 | Na Sibiři se používá jako zelenina. List podobný okrasným travám, dlouhou dobu svěží. Domácí druh. Nať je výborná do pomazánek, salátů, na vařené brambory. Trvalka, dobře přezimuje, při teplotách těsně nad nulou raší mladé listy, použitelné v kuchyni. Slunné stanoviště, propustná zemina. Vysazení cibule a česneku v zahradě je v literatuře doporučováno jako přírodní prevence proti kadeřavosti listů u broskvoní a černé skvrnitosti růží. |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------|-------|--|---------------------|------------|-----|--------------------|-----|---|-----|------|--|
| Allium schoenoprasum | pažitka | gen | 30 | | fialová | VI.-VII. | S-p | | ano | o | | 10 | Známa a široce používaná raná zelenina, vysoký obsah vitamínu C v listech. Použitelná i pro střešní zahrady. |
| Alyssum sax. Compactum Gold Dust | tařice skalní | gen | 20 | | žlutá | IV.-V. | s | St1, FS1, SF1, MK1 | | | | 8-10 | Šedý list. V době květu velice výrazná trvalka. Snáší suché stanoviště. Do skalek, zídek. |
| Androsace sempervivoides | | veg | 5 | | růžový | 5-6 | s | A2, St2 | | | | | Do skalek, zídek. |
| Anemone hupehensis Praecox, výsev ! | | gen | 70 | | růžový | 8-9 | S-p | | | | | | |
| Anemone hupehensis Pink Saucer, výsev! | | gen | 90 | | růžový | 8.-10. | S-p | | | | | | |
| Anemone hybrida Bressingham Glow, výsev! | | gen | 70 | | růžový | 8-10 | S-p | | | | | | |
| Anemone hybrida Pamina, výsev! | | gen | 0,8 m | | růžový | 8-9 | S-p | | | | | | |
| Anemone sylvestris | sasanka lesní | gen | 40 | | bílá | VI.-IX. | S-p | GR1, FR1, SH1 | | | | 8 | Hodnotná, dlouhověká, domácí trvalka. |
| Angelica gigas | angelika | gen | 140 | | tmavěčervený | VI.-VIII., | s | | | | řez | s-8 | Výrazná solitera, zlatá medaile na Plantarium Boskoop 1993 |
| Anthemis nobilis Flore Pleno | heřmánek římský, rmen slíchný | veg | 15 | | bílý, plný | | s | | ano | | | 16 | Léčivý účinek byliny jako u heřmánku pravého. Kryt půdy, náhrada trávniku na prudkém slunci a sušším stanovišti, do okenních truhlíků v kombinaci s Helichrysum italicum a jinými bylinkami. |
| Aquilegia caerulea Yellow Star | orlíček | gen | 60 | | žlutý | V.-VII. | S-p | B2, GR2 | | | řez | 8 | Bohatě kvete, přesévá se – cestuje v záhonu. |
| Aquilegia canadensis Little Lanterns | orlíček | gen | 25 | | červená | V.-VI. | S-p | | | | | 11 | Méně obvyklý nízký kultivar. |
| Aquilegia vulgaris Ruby Port | | gen. | 0,7m | | tmavěčervený | 5-6 | | | | | | | |
| Arabis caucasica Compinkie | huseník | | 10 | | růžová | III.-IV. | s | St2, M2, SF2 | | | | 12 | Do skalek a suchých zídek, okraj záhonu, kryt půdy |
| Artemisia dracunculus | pelyněk estragon | gen | 90 | | šedozelelý | VII.-VIII. | s | | ano | | | | Koření k masu, do zeleninových salátů. Zlepšuje trávení |
| Artemisia pontica | pelyněk pontský | veg | 40 | | šedozelelý | VII.-VIII. | s | | ano | | | | Šedý list. Do suchých partií, odnožuje |
| Aruncus aethusifolius | | gen | 30 | | bílý | V.-VII. | p | St2 | | | | 8 | Do podrostu v polostínu, do skalky |
| Aruncus dioicus | | gen | 160 | | bílý | 5.-6. | | | | | | | |
| Asarum europaeum | kopytník evropský | | 10 | | hnědý | IV. | P-t | G2 | | | | 12 | Stálezelený list. Na stinná místa, výborný půdní kryt v sušším stínu. Zpočátku pomalejší růst. Opylován mravenci. |
| Asphodeline lutea | asfodelka | | 80 | | žlutá | VI., VII. | s | St, FS1, FR1 | | | | 8 | Šedý list. Do slunných partií, kombinace s Iris barbata nana, Iris pumila, Yucca filamentosa, Papaver orientale, Eryngium, Artemisia schmidtiana |
| Aster alpinus | | gen | 15 | | modrý, bílý, růžový | 5-6 | | | | | | | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----|-----|---|---------------------|-------------|-----|------------------|--|----|-----|-----|---|
| Aster divaricatus | astra | gen | 50 |  | bílý | IX.-X. | S-p | GR2, FR2 | | an | řez | 6 | Snáší sušší stín, ozdobná i po odkvětu. Dobrá doplňková do kytic. |
| Aster dumosus | astra | | 25 |  | růžový | IX., X. | s | B2, Fr2 | | an | | 8 | Kompaktní, spolehlivá. Zářivá barva květu. Jako všechny astry dobrá v kombinaci s jarními cibulovinami – např. Narcisy. |
| Aster dumosus cf. Prof A. Kippenberg | astra | veg | 40 |  | modrofialový | IX., X. | s | B2, Fr2 | | an | | 8 | Spolehlivý kultivar, vyšlechtěn r. 1949. |
| Aster dumosus kv. | astra | veg | 25 |  | bílý | X. | s | B2, Fr2 | | an | | 8 | |
| Aster dumosus kv. | astra | veg | 60 |  | modrofialový, velký | X. | s | B2, Fr2 | | an | | 8 | |
| Aster dumosus kv. | astra | veg | 25 |  | bílý | X. | s | B2, Fr2 | | an | | 8 | |
| Aster ericoides Schneetanne | astra | veg | 120 |  | bílý | X.-XI. | s | B2, Fr2 | | an | řez | | Jedna z posledních aster během roku, použitelná do vazby, dlouho kvete. Květy jemné. |
| Aster n.-a. cf. Alma Potschke | astra | veg | 100 |  | sytě růžový | X. | s | B2, Fr2 | | an | řez | s-3 | Zářivá barva květu. Vhodná do zapojených partií, spodní třetina rostliny v době květu hnědné. |
| Aster novi-belgii | astra | veg | 120 |  | bílý | IX.-X. | s | B2, Fr2 | | an | řez | s-3 | Odnožuje, rozrůstá se dost rychle. Výborná do vazby, dlouho kvete. |
| Aster ptarmicoides | astra | gen | 35 |  | bílý | VII.-IX. | s | | | | | | |
| Astilbe arendsii kv. | čechrava | veg | 90 |  | lososově růžový | VII.-VIII. | P-t | G2, GR2, Fr2, B2 | | | řez | 7 | Vitální. Květ lososově růžový, vzdušný. Výborný do vazby. |
| Astilbe chinensis var. Pumila | čechrava | gen | 25 |  | lila | VIII.-IX. | P-t | GR1-2, FR2 | | | řez | | Druh je na zásobování vodou méně náročný než Astilbe arendsii. |
| Astilbe japonica Deutschland | čechrava | veg | 70 |  | bílý | VII., VIII. | P-t | G2, GR2, Fr2, B2 | | | řez | 7 | |
| Astrantia major Rosensymfonie | | gen | 70 |  | červeno růžový | 6-8 | | | | | | | |
| Astrantia major Snow Star | | gen | 80 |  | bílý | 7.-9. | | | | | | | |
| Aubrieta cult. Whitewell Gem | taříčka | gen | 10 |  | růžovofialový | IV.-V. | s | SF2, FS2 | | an | | 12 | Výborná do skalek, suchých zídek, pro pokryv půdy na plném slunci. Bohatě kvete. |
| Baptisia australis | baptisie | gen | 120 |  | modrofialový | IX., X. | s | GR2, Fr2 | | | řez | s-4 | Severoamerická statná trvalka. Květ podobný vlčímu bobu. Snáší i sušší místa. |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|----|--------------|------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-------|---|--|
| Belamcanda chinensis | angínovník | gen | 50 | oranžový | VII.-VIII. | s | | ano | | | | | tectoridin), flavonoidy, třísloviny, silice, trochu saponinů a zřejmě i blíže neprozkoumané alkaloidy. Oddenku se užívá při poruchách žláz s vnitřní sekrecí (např. pohlavní žlázy), při revmatismu, při nadýmání a zácpě a protože působí i močopudně, lze jej aplikovat i při chorobách ledvin a močových cest. List se užívá obvykle čerstvý, jeho žvýkání může pomoci při angíně nebo zahlenění. Oddenek se podává ve formě odvaru, jenž se pije 4x denně po 125 ml. Angínovník působí poměrně razantně až mírně toxicky, proto by se jej nikdy nemělo užívat v nadměrných dávkách. Žvýkání čerstvých listů by nemělo trvat déle než půl minuty a nemělo by se opakovat více než 6x denně. Při déletrvajícím žvýkání se totiž u některých jedinců mohou objevit dosti nepříjemné alergické reakce (otoky dýchacích cest). Informace v tomto odstavci převážně převzaty z: J. Janča, J.A.Zentrich: Herbář léčivých rostlin, díl 6. |
| Bergenia cordifolia Rotblum | bergenie | gen | 30 | růžový | III.- V. | P-t | GR2, St2, Fr2, WR2 | ano | | řez | 8 | Červenající, stálezelený list. Snáší suchý stín. List barví na zimu do červena. Vyrovnané kvetení | |
| Calamintha nepeta ssp. Nepeta White Cloud Strain | | gen | 35 | bílý | 7.-9. | | | ano | | | | | |
| Camassia leichtlinii | | veg | 80 | světlemodrý | 5-6 | | | | | | | | |
| Campanula carpatica | | gen | 25 | světlemodrý | 6.-8. | | | | | | | | |
| Campanula latifolia | | gen | 90 | modrofialový | 7-8 | | | | | | | | |
| Campanula latiloba Alba | zvonek | | 60 | bílý | VI.-VII. | s | GR1, Fr1-2 | | | řez | 8 | List stálezelený, tmavý. | |
| Campanula persicifolia | | gen | 70 | modrý, bílý | 6-8 | | | | | | | | |
| Campanula poscharskyana | | gen | 20 | modrý | 7-9 | | | | | | | | |
| Ceratostigma plumbaginoides | | veg | 20 | modrý | VIII.-IX. | P-t | Fr1-2, ST, FS1 | | | | 8 | Nat' barví na podzim výrazně do oranžova. Dobrá v suchém stínu. | |
| Convallaria majalis | konvalinka vonná | veg | 20 | bílý | V., VI. | p | | | ano | řez | 10 | Vitální, snáší sušší stín, odnožuje až zapleveluje. Výrazně voní. Jedovatá. | |
| Corydalis cheilanthifolia | dymnivka | gen | 25 | žlutý | V.-VIII. | P-t | G2, GR2, SF2, M2 | | | | 8 | Méně známá dymnivka, vitální až zaplevelující. Velmi jemně dělený list. Kvete několikrát v roce dosti bohatě. | |
| Cyclamen coum | brambořík | gen | 10 | růžový | III.-IV. | p | G1-2, GR1-2, St1-2 | | | | 16 | Mrazuvzdorný. Zimovat pod nastýlkou listů. | |
| Cyclamen purpurascens | brambořík | gen | 15 | růžový | VII.-IX. | p | G1-2, GR1-2, St1-2 | | ano | | 16 | Mrazuvzdorný, vyzkoušený. Zimuje pod nastýlkou listů, ideálně dubového nebo bukového. Květy krásně voní. | |
| Delosperma basuticum | delosperma, kosmatec | veg | 5 | žlutý | VI.-IX.. | s | | | | | 16-20 | Zářivé květy, opakované kvetení, svěže zelené listy. Přitisklý vzrůst, vitální. Výborná pro skalky, suché zídky - na plném slunci a s dobrou drenáží. | |















trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|--------|-------------------------|-----------|-----|----------|-----|---|-----|-----|---|---|
| Delosperma nubigenum | kosmatec | veg | 0,05 m | žlutý | 6-9 | | | | | | | | |
| Delosperma sutherlandii | delosperma, kosmatec | | 8 | růžový | V.-VIII. | s | | | | | | 16-20 | Opakované kvetení, svěží barva květu. Na plné slunce. |
| Delphinium el. Magic Fountains Pure White | ostrožka | gen | 140 | bílý | VI.-VII. | s | | | | | řez | 3-4 | Tradičně pěstovaná „babičkovská“ trvalka. |
| Delphinium Pacific – hybr. Astolat Premium | ostrožka | gen | 180 | růžový, bílý střed | 6.-7. | | | | | | | | |
| Delphinium Pacific – hybr. King Arthur Premium | ostrožka | gen | 160 | tmavom odřý, bílý střed | 6.-7. | | | | | | | | |
| Dianthus Annette | hvozdík | veg | 10 | růžový | 5.-7. | | | | | | | | |
| Dianthus carthusianorum | hvozdík | gen | 40 | růžový | 6-7 | | | | | | | | |
| Dianthus deltoides kv. | hvozdík | veg | 15 | červený | VI.-VII. | s | | | | | | 12-15 | Vitální, do skalek, suchých zídek, na okraj záhonů a cest. Velmi výrazná barva květu. |
| Dianthus gratianopolitanus | hvozdík | | 15 | růžový | VI.-VII. | s | | | | ano | | 12-15 | Vitální, polštáře šedých listů, velmi vonný květ. |
| Dianthus gratianopolitanus cv. | hvozdík | veg | 15 | růžový, plný | 5-6 | | | | | | | | |
| Dianthus plumarius lne | hvozdík | veg | 30 | bílý, červené oko | 6-7 | | | | | | | | |
| Dicentra spectabilis | srdcovka | gen | 50 | bílorůžový | IV.-V. | S-p | | | | | řez | 3-5 | Tradiční „babičkovská“ trvalka. Původní na východě Asie, poprvé v západní kultuře vykvetla v r. 1847. Na jaře brzy raší, od srpna zatahuje. Vhodné kombinovat s trvalkami, které v létě skryjí žloutnoucí listy. Dlouhověká „vytrvalka“. Nemá ráda přesazování. |
| Digitalis mertonensis | | gen | 70 | růžový | 6.-8. | | | | | | | | |
| Digitalis purpurea | náprstník | gen | 80 | bílý, růžový, červený | VI.-VIII. | S-p | GR2, FR2 | | | | řez | 9-12 | Výrazný druh, krátkověký, hojně se přesévá a ve výsadbě putuje. Výborný do přírodních zahrad. Jedovatý. |
| Doronicum orientale Magnificum | kamzičník | gen | 50 | žlutý | IV.-V. | s | | | | | řez | 7 | Tradiční trvalka, výborná k řezu. Velmi vhodná do venkovských zahrad. |
| Dryas suendermannii | dryádka | veg | 15 | bílý | V.-VI. | S-p | | | | | | 9-12 | Hybrid z roku 1910. Bujná, vhodná do větších skalek. |
| Echinacea pallida | | gen | 80 | růžový | 7-9 | | | | | | | | |
| Echinacea paradoxa var. Paradoxa | | gen | 80 | žlutý, tmavý střed | 7-9 | | | | | | | | |
| Echinacea purp. Magnus Superior | třapatka | gen | 100 | růžový | VII.-IX. | s | | ano | o | řez | 5-8 | Módní trvalka. Intenzivně vybarvený květ, vitální, kvete od července do podzimu. Velice oblíbená mezi motýli. | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------|--|----------|-----|------------------|-----|---|-----|------|---|
| Echinacea purpurea Cheyenne Spirit | | gen | 80 | žlutý, oranžový, červený, růžový, tmavý střed | 7.-9. | | | | | | | směs barev |
| Echinacea purpurea Alba | třapatka | gen | 90 | bílý | VII.-IX. | s | B2-3, FR2-3, GR2 | ano | o | řez | 5-8 | Smetanově bílý kultivar módní trvalky. Hnědozlatý terč. |
| Echinacea purpurea Prairie Splendor | | gen | 90 | růžovop urpurov ý | 7.-9. | | | ano | | | | |
| Epimedium pinnatum ssp. colchicum | škornice | veg | 30 | žlutý | IV. | P-t | | | | | 9-12 | Stálezelený list, který je vhodné těsně před vyrašením nových květů odstranit. Květ výrazně žlutý. Vynikající, velmi odolná – takřka neprůstředlná trvalka do suchého stínu. Vhodná např. jako podsadba listnatých dřevin. Vhodný soused je například Helleborus – čemeřice, Omphalodes – pupkovec. |
| Epimedium pubigerum Orange Queen | | veg | 40 | oranžov ý | 4. | | | | | | | |
| Epimedium versicolor cf. Sulphureum | škornice | veg | 30 | světle žlutý | III.-IV. | P-t | | | | | 9-12 | |
| Epimedium x rubrum | škornice | veg | 30 | bíločerv ený | III.-IV. | P-t | | | | | ta | Červenobílý květ brzy na jaře, současně s rašením listů. Velmi odolná trvalka, snáší suchý stín pod listnatými dřevinami. |
| Euphorbia amygdaloides Purpurea | | veg | 0,5 | tmavěč ervenož lutý | 4.-5. | | | | | | | |
| Euphorbia amygdaloides Robbiae | | veg | 60 | žlutozel ený | 4-5 | | | | | | | |
| Euphorbia cypyrissias Ruby Glow | pryšec chvojka | | 20 | žlutý | IV.-V. | S-p | | | | | 5-7 | Raně kvetoucí pryšec chvojka, na jaře tmavěčervené listy a květ, na podzim celá rostlina barví do oranžova. Odnožuje, velmi vitální, může být až zaplevelující. Výborný do velkých a extenzivních zahrad, do šterkových záhonů. |
| Euphorbia characias ssp. Wulfenii | | gen | 60 | zelenožl utý | 4-6 | | | | | | | |
| Euphorbia myrsinites | pryšec | | 15 | žlutý | IV. | s | | | | | | Plazivý druh s výraznými šedými listy. Zelenožlutý květ brzy na jaře. Výborný do skalek, suchých zídek, šterkových záhonů. Potřebuje dobrou drenáž. |
| Euphorbia polychroma | pryšec mnohobarvý | | 40 | žlutý | IV.-V. | s | | | | řez | 5-7 | Domácí druh. Velmi odolná rostlina vhodná do slunečných až polostinných partií. Snáší sucho. Kveté dost brzy na jaře – listeny v květu zelenožluté, výrazné. Výborná i do vazby, jen je třeba počítat s tekoucím mlékem – latexem. Krásná kombinace ve vazbě např. s Polygonatum hybr. Weihenstephan – kokořík. |
| Fragaria vesca Rujana | | gen | 0,25 m | bílý | 5.-9. | | | | | | | červený, jedlý, chutný plod |
| Gaillardia ar.Goblin | | gen | 0,4m | červeno žlutý | 5.-9. | | | | | | | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|-----|---|-----------------|------------|-----|--|--|-----|--|-----|-------|--|
| Gaillardia aristata Amber Wheels | kokarda | gen | 75 |  | žlutý | VI.-IX. | s | | | | | řez | 7-9 | U nás novinka, má být vhodná i do vazby. |
| Gaillardia aristata Goblin | kokarda | gen | 35 |  | červeno žlutý | VII.-X. | s | | | | | | | Ověřený kultivar. Velmi dlouhé období květu. Na záhonu dlouho vydrží – asi také z přesevu. Vyžaduje plné slunce, na nedostatek vody není příliš citlivá. |
| Gaura lindheimeri | gaura | gen | 100 | | bílý | VII.-X. | s | | | | | řez | 5-7 | Královna podzimního vyprahlého záhonu. Ve velmi dobře zavlažovaných a hnojených záhonech se neprojeví její přednosti. Naše první setkání s ní bylo v polopouštní partii, tam byla nepřekonatelná. Je výborná pro kamenitý záhon s výbornou drenáží na plném slunci. Kvete od července do zámrazu, na sušším stanovišti vzpřímená, vzdušná, květy jako motýlci. Krátkověká, může se přesévat. |
| Gaura lindheimeri Sparkle White | | gen | 70 | | bílý | 6-10 | | | | | | | | |
| Gentiana x acaulis Frohnleiten | hořec | veg | 10 |  | modrý | | s | | | | | | | |
| Gentiana lutea | hořec žlutý | gen | 120 |  | žlutý | VII.-VIII. | s | | | ano | | | 3-4 | Součást bylinných směsí pro likéry. Výborná bylina pro žaludeční a žlučnickové potíže. Zajímavá trvalka pro slunné a polostinné partie s půdou dobře zásobenou vodou, vzduchem a živinami. |
| Geranium cantabrigiense | kakost | veg | 20 |  | růžový | VI.-VIII. | p | | | | | | 9-12 | Pro půdní kryt v polostínu. Dlouho kvetoucí, na podzim barví celá rostlina do červeno oranžova. Potřebuje vzdušné půdy. |
| Geranium macrorhizum | kakost | veg | 30 |  | růžový | VI.-VII. | p | | | | | | 7-9 | Velmi bujný půdní kryt, ideální do polostínu i hlubšího stínu. Pak má stálezelený list. Pěkný květ, celá rostlina výrazně voní – páchne. |
| Geranium oxonianum cf. Wargrawe Pink | | veg | 50 |  | růžový | 6-7 | | | | | | | | |
| Geranium oxonianum Summer Surprise | | veg | 80 |  | růžový | 6.-9. | | | | | | | | |
| Geranium Philippe Vapelle | kakost | veg | 30 |  | fialový | VI.-VII. | S-p | | | | | | 7-9 | Kříženec G. Platypetalum a G. Renardii z roku 1991. Zajímavá modrofialová barva květu. Snáší i sušší polostín. |
| Geranium sanguineum | | veg | 35 |  | růžový | 6.-7. | | | | | | | | |
| Geranium sanguineum Album | kakost krvavý | veg | 30 | | bílý | VI. | S-p | | | | | | 7-9 | Velmi odolný kakost, kultivar domácího druhu. Snáší sušší půdy. Sněhobílý květ. |
| Geum coccineum | kuklík | gen | 50 |  | oranžový | V.-VI. | S-p | | | | | řez | 7-9 | |
| Geum chilense Mrs. Bradshaw | | gen | 70 | | červený, zářivý | 5-6 | | | | | | | | |
| Gilenia trifoliata | | gen | 80 | | bílý | 6-7 | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea Variegata | popenec břečťanolistý | veg | 10 |  | modrý | | S-p | | | | | | 7-9 | Běžně se používá do letničkových výsadb – truhlíků, závěsných nádob. Ozdobný dvoubarevným listem, bujný růst šlahounů, na zemi přikořeňujících. Vydrží mírnější zimu i bez krytu. |
| Globularia cordifolia | koulenka srdcolistá | veg | 10 |  | modrý | VI.-VII. | s | | | | | | 12-16 | Skalnička s modrým kulovitým květenstvím. Vytváří husté polštáře – koberce. |
| Helianthemum h. Amabile Plenum | devaterník | veg | 15 |  | červený | VI.-VII. | s | | | | | | 9-12 | Výrazně červený květ. „Roztomile plnokvětý“ by se česky řeklo. Snáší sušší půdy. Dobrý půdní kryt. Vhodný k cestám, do suchých zídek, skalkových partií. |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----|--|--------------------------------------|------------|-----|--|--|---------|-----|------|---|--|
| Helianthemum hybr. Elfenbeglanz | | veg | 15 | | žlutobílý | 6.-7. | | | | | | | | |
| Helianthemum hybr. Sterntaler | devaterník | | 15 | | žlutý | VI.-VII. | s | | | an o | | 9-12 | Dost velký, zářivě žlutý květ. Vitální, vhodný i do sušších partií. | |
| Helianthemum hybridum Mandarin | | veg | | | oranžov ý | 5.-6. | | | | | | | | |
| Helianthemum hybridum Pink Double | | veg | 20 | | růžový, poloplňný | 5.-6. | | | | | | | | |
| Helianthemum Lawrenson's Pink | | veg | 20 | | růžový | 6.-7. | | | | | | | | |
| Helleborus foetidus | | gen | 50 | | zelený | 3.-4. | | | | | | | | |
| Helleborus niger | | gen | 35 | | bílý | 3.-4. | | | | | | | | |
| Helleborus orientalis | | gen | 35 | | zelenob ílý | 3.-4. | | | | | | | | |
| Helleborus orientalis | | gen | 35 | | Zelenob ílý – tmavoč ervený | 3.-4. | | | | | | | | |
| Helleborus orientalis (H. Hybridus) | čemeřice východní | gen | 30 | | Zelenob ílý- červený | III.-IV. | P-t | | | | řez | 5-7 | Výborná podrostová trvalka – velmi dlouhověká, zpočátku může být pomalá v přirůstání. Květ má barvu od zelenobílé přes růžovou až po purpurově červenou. Množena semenem. | |
| Hemerocallis Atlas | čemeřice východní | veg | 90 | | žlutý | VII.-VIII. | s | | | | | 3-5 | Velmi výkonný americký kultivar z roku 1951. | |
| Hemerocallis Aten | denivka | veg | 90 | | oranžov ý | VII.-VIII. | s | | | | | 3-5 | Velmi výkonný americký kultivar z roku 1951. Zářivě oranžovo žlutá barva květu. | |
| Hemerocallis Frans Hals | | veg | 80 | | žlutočer vený | 7.-8. | | | | | | | Všechny denivky mají jedlé květy. Testováno na lidech. | |
| Hemerocallis Crimson Pirate | denivka | veg | 60 | | červený | VII.-VIII. | s | | | | | 5 | Tmavěčervený květ. Rychle přirůstá. | |
| Hemerocallis fulva | denivka | veg | 100 | | oranžov ý | VII.-VIII. | s | | | | | 3-5 | Původní druh z Číny a Koreje. Velmi vytrvalý, zplaňující. Vhodný do velkých a extenzivních partií. | |
| Hemerocallis Gold Dust | denivka | veg | 70 | | žlutý | VII.-VIII. | s | | | | | 5 | | |
| Hemerocallis Hyperion | denivka | veg | 90 | | žlutý | VII.-VIII. | s | | | | ano | 3-5 | Citronově žlutý, vonný květ, dlouhé, úzké plátky. Ve větších skupinách vhodný s jinými žlutými kultivary. | |
| Hemerocallis Pink Charm | denivka | veg | 70 | | růžový | VII.-VIII. | s | | | | | 5 | | |
| Hemerocallis Red Rum | | veg | 80 | | tmavěč ervený | 7-8 | | | | | | | | |
| Hemerocallis Sammy Russell | denivka | veg | 70 | | červený | VI.-VII. | s | | | | | 5 | | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|--------|-------|---------------|-----------|-----|--|--|--|--|-----|-------|-----|--|--|--|
| Hemerocallis Stella d Oro | | veg | 50 | žlutý | zlatožlutý | 7-9 | | | | | | | | | | | |
| Heuchera americana Palace Purple Select | dlužicha | gen | 60 | | bílý | | S-t | | | | | | | | | | Oblíbená dlužicha s temně červeným listem. Vhodná zejména do polostinných a stinných partií. Na zimu vhodná příkrývka. K dispozici od června 2015. |
| Heuchera brizoides Firefly | dlužicha | gen | 50 | | červený | V.-VI. | S-p | | | | | řez | 8-12 | | | | Osvědčená dlužicha se zeleným listem a ohnivě červeným květem, vhodným i do vazby. |
| Hieracium aurantiacum | | gen | 40 | | oranžový | 5.-6. | | | | | | | | | | | |
| Hosta Aureomarginata | hosta, bohyška | veg | 60 | | světlefialový | VI.-VII. | P-t | | | | | řez | 5-7 | | | | Osvědčený kultivar – statná bohyška se žlutým okrajem listu. Vhodná pro polostín a hlubší stín např. pod listnáči, na stinné straně budov. |
| Hosta Blue Angel | | veg | 80/120 | | fialový | 7-8 | | | | | | | | | | | |
| Hosta cf. Sieboldii | | veg | 70 | | bílý | 7.-8. | | | | | | | | | | | |
| Hosta fortunei Aureomarginata | | veg | 50/80 | | bílofialový | 7-8 | | | | | | | | | | | |
| Hosta lancifolia | hosta, bohyška | veg | 80 | | fialový | VII.-IX. | P-t | | | | | ano | řez | 7-9 | | | Vitální, odolná bohyška. Užší list. |
| Hosta minor | hosta, bohyška | | 30 | | fialový | VI.-VII. | P-t | | | | | řez | 10-12 | | | | Velmi nízký a kompaktní druh, vhodný pro menší zahrady, do nádob. |
| Hosta nigrescens Krossa Regal | | veg | 60/90 | | světlefialový | 7.-8. | | | | | | | | | | | |
| Hosta plantaginea | | veg | 80 | | bílý, vonný | 8.-9. | | | | | | | | | | | |
| Hosta Sea Saw | | veg | 30/90 | | světlefialový | 6.-7. | | | | | | | | | | | úzký list s bílým okrajem |
| Hosta sp. | hosta, bohyška | veg | 90 | | světlefialový | VI.-VII., | P-t | | | | | řez | 5-7 | | | | Odolný, osvědčený kultivar, bílý okraj listu |
| Hosta tardiana | hosta, bohyška | veg | 90 | | světlefialový | | P-t | | | | | řez | 5-7 | | | | šedý list |
| Hosta undulata Undulata | hosta, bohyška | veg | 60 | | světlefialový | VI.-VII. | P-t | | | | | řez | 7-9 | | | | Zvlněný zelenobílý list. |
| Hosta Whirlwind | | veg | 60 | | světlefialový | 7.-8. | | | | | | | | | | | List tříbarevný – olivová, zelená, bílá, kompaktní trsy. |
| Hylomecon japonica | | veg | 30 | | žlutý | 4.-5. | | | | | | | | | | | |
| Hypericum olympicum | | gen | 30 | | žlutý | | | | | | | | | | | | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|-----|--|---------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zanět, astma apod.), kde působí desinfekčně až antibioticky a podobně působí i na močové ústrojí. Příznivě působí i v oblasti trávicího traktu, účinný je při zánětech, dyspeptických potížích spojených s nadýmáním či chronickém střevním kataru. Působí jako mírné tonikum, stimuluje organismus, čehož lze výhodně využít zejména při léčbě starších osob. Za studena podávaný zabraňuje pocení (hlavně nočnímu a klimakterickému). Podává se nejčastěji ve formě nálevu nebo odvaru (2 čajové lžičky drogy se ve 1/4 l vody přivedou k varu a nechají se 5 minut luhovat, pije se 2x denně) nebo se užívá zevně ve formě kloktadla např. při zánětu hrtanu či mandlí, yzopový sirup se osvědčil při zahlenění a na podporu vykašlávání. Yzopové víno údajně působí jako afrodisiakum (75 g drogy se 8 dní luhuje v 1 l bílého vína, pije se pak večer před spaním po 125 ml a před pohlavním stykem se rychle vypije 1/4 l tohoto vína). Informace v tomto odstavci převážně převzaty z: J. Janča, J.A.Zentrich: Herbář léčivých rostlin, díl 5. | |
| Hyssopus officinalis | yzop lékařský | gen | 60 | | modrý | VII.-IX. | s | | | | | | | | řez | 8 | | | |
| Chrysanthemum coc. Robinsons Giant | kopretina | gen | 60 | | červený | VI.-VII. | s | | | | | | | | řez | 10 | | Oblíbená potrava slimáků. | |
| Chrysanthemum indicum Poesie | | veg | 70 | | bílý | 10.-11. | | | | | | | | | | | | | |
| Chrysanthemum maximum | kopretina | | 80 | | bílý | VI.-VII. | s | | | | | | | | řez | 5-7 | | | |
| Chrysanthemum maximum Snowdrift | kopretina | gen | 70 | | bílý | VI.-VIII. | s | | | | | | | | řez | 7 | | Poloplňá kopretina, velmi pěkná k řezu. | |
| Chrysanthemum maximum, jednoduchá | | gen | 80 | | bílý | 6. -8. | | | | | | | | | | | | | |
| Chrysanthemum serotinum Leucanthemella serotina) | luhovnice pozdní | gen | 150 | | bílý | IX.- X. | s | | | | | | | | řez | 3-5 | | | |
| Incarvillea mairei | | gen | 20 | | růžový, velký | 5-6 | | | | | | | | | | | | | |
| Inula ensifolia | oman mečolistý | gen | 40 | | žlutý | VII.-VIII. | s | | | | | | | | řez | 12-15 | | Výborná domácí trvalka ze stepí. Husté trsy, kompaktní vzrůst. | |
| Iris gramineus | | veg | 30 | | růžovofialový | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Iris sibirica White Swirl | kosatec sibiřský | veg | 80 | | bílý | VI. | s | | | | | | | | řez | 5-7 | | Kultivar s velkým bílým květem. | |
| Iris sibirica, velkokvětý kv. | kosatec sibiřský | veg | 70 | | modrý | VI. | s | | | | | | | | řez | 5-7 | | velký, tmavěmodrý květ | |
| Kirengeshoma palmata | | veg | 80 | | žlutý | 8.-9. | | | | | | | | | | | | | |
| Kniphofia uvaria Grandiflora | Kleopatřina jehla | gen | 80 | | oranžový | VII.-IX. | s | | | | | | | | řez | 5-7 | | Osvědčený žlutočervený kultivar. | |
| Lamium galeobdolon | | veg | 20 | | žlutý | 5.-6. | | | | | | | | | | | | | |
| Lamium maculatum Red Nancy | | veg. | 20 | | růžovočervený | 7-8 | | | | | | | | | | | | bílošedý list | |
| Lavandula ang. Beate | | veg | 40 | | tmavě modrý | 6-9 | | | | | | | | | | | | | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|--|----------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| Lavandula ang. Ellagance Snow | levandule lékařská | | 40 | | bílý | VI.-VIII. | s | | ano | ano | řez | 9-12 | Bílokvětý kultivar levandule. |
| Lavandula angustifolia | levandule lékařská | gen | 40 | | modrý | VI.-VII. | s | | ano | ano | řez | 9-12 | |
| Lavandula angustifolia Hidcote Blue | levandule lékařská | veg | 40 | | modrý | VI.-VIII. | s | | ano | ano | řez | 9-12 | Vyrovnaný výsev tmavěmodrého kultivaru. |
| Lavandula angustifolia Munstead | | veg | 40 | | modrofialový, světlý | 7-8 | | | | | | | |
| Leucanthemum x superbum Sněhurka | | veg | 60 | | bílý, plný | 7-8 | | | | | | | |
| Levisticum officinale | líbeček | gen | 130 | | žlutý | VII. | s | Fr2 | ano | | | | |
| Lewisia cotyledon | levisie | gen | 20 | | růžový | V.-VI. | s | | | | | 12-15 | Skalnička, nesnáší mokro, zvláště v zimě. |
| Lewisia cotyledon Regenbogen | levisie | gen | 20 | | růžový | V.-VI. | s | | | | | 12-15 | Skalnička, nesnáší mokro, zvláště v zimě. |
| Liatris spicata Floristan Violet | šuškarda | gen | 70 | | fialový | VII.-VIII. | s | | ano | | řez | 8 | Trvalka oblíbená pěstiteli, floristy i motýly. |
| Liatris spicata Floristan White | | gen | 70 | | krémový | 7-9 | | | | | řez | | |
| Liatris spicata Kobold Strain | | gen | 40 | | fialovorůžový | 7-9 | | | | | | | |
| Lilium martagon | lilie zlatohlavá | gen | 80 | | růžový | V.-VII. | S-p | | | | řez | s-8 | Domácí druh. Zpočátku pomalý růst. Cibulnatá. |
| Linum flavum | | gen | 40 | | žlutý | 6-8 | | | | | | | |
| Linum perenne | len vytrvalý | gen | 60 | | modrý | VI.-VII. | s | | | | řez | 9-12 | Nenáročný druh pro slunná a sušší stanoviště. V květu pěkný, po odkvětu ozdobný plody. Vzdušný dojem . |
| Liriope spicata | | veg | 20 | | fialový | VII.-IX. | P-t | | | | | 9-12 | Zcela nepěstovaná trvalka – ta naše je přímý dovoz ze Severní Koreje. Stálezelené tmavě trávovité listy, husté trsy, odnožuje – rozšiřuje se. Květ fialový, nepřilíš nápadný, plody černé. Výborná pro podsadbu stromů, na zcela stinnou stranu budov, do nádob ve stínu např s Buxusem . Zcela mrazuvzdorná. Snáší suchý stín! |
| Lunaria rediviva | | gen | 90 | | růžový | 4-5 | | | | | | | |
| Lupinus Edelknaben, strain | | gen | 90 | | červená | 5.-6. | | | | | | | |
| Lychnis arkwrightii Vesuvius | kohoutek | gen | 30 | | červený | VI.-VII. | s | | | | řez | 7-9 | Ohnivě červené květy a tmavozelený-tmavočervený list. Dobré oživení záhonu. |
| Lychnis flos-jovis | | gen | 30 | | růžový | 6.-7. | | | | | | | |
| Lychnis chalcedonica | | gen | 80 | | červený | 7.-8. | | | | | | | |
| Lychnis viscaria splendens Feuer | | gen | 50 | | růžový | 5-6 | | | | | | | |
| Lysimachia clethroides | vrbina sehnutá | veg | 80 | | bílý | VII.-VIII. | p | | | | řez | 5-7 | Velmi odolná trvalka do vodou dobře zásobeného stanoviště – ideálně v polostínu. Odnožuje – rozrůstá se. Dlouhá doba kvetení. |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----|----|------------|------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Lysimachia nummularifolia Aurea | | veg | 5 | žlutý | 6.-8. | | | | | | | | |
| Lysimachia punctata | vrbina tečkovaná | veg | 80 | žlutý | VI.-VIII. | S-p | | | | řez | 8 | | Velmi vitální trvalka. Výborná na slunci i v polostínu – podstatně je dobré zásobení vodou. Dost dlouhá doba kvetení. |
| Matteucia struthiopteris | pérovník pštroší | veg | 70 | | | P-t | G2-3, GR2-3, RF3 | | | řez | 3-5 | | Kapradina. Odnožuje a na vhodných místech se rozšiřuje. Zpočátku pomalejší, ale po dobrém usazení věrná. Nemá ráda sucho a vhodný je vzdušnější substrát. Rašící – roztácející se – dlouhé listy (stejně jako u jiných kapradin) jsou neodolatelné. Malíř Hundertwasser použil motiv rozvíjející se kapradiny pro svůj návrh vlajky Nového Zélandu. |
| Melissa officinalis | meduňka lékařská | gen | 70 | žlutý | VII.-VIII. | s | FR1-2, GR1-2, ST1-2 | ano | | | 5-7 | | traktu (žaludeční neurózy) a srdce (srdeční neurózy, bušení srdce apod.), zvyšuje sekreci žluče, zabraňuje tvorbě plynů, zpomaluje tep, mírně snižuje krevní tlak. Podle J.A.Zentricha rovněž posiluje centrální nervový systém, působí sedativně, uvolňuje křeče a napětí svalstva, lze ji použít u lehčích forem neurastenii, depresí, proti migréně, u alergií nervového původu (např. astma vyvolané stresem), pomáhá při bolestech břicha, při nadýmání, při infekčních průjemových chorobách, při bolestivé menstruaci i v klimakteriu. Zevně lze meduňky použít na revmatické opuchliny, pohmožděniny a krevní podlitiny, u kojících žen při nebezpečí ztvrdnutí mléka v prsech. Nálev se obvykle připravuje z jedné čajové lžičky drogy na šálek vroucí vody - denně se pije 2 až 3 šálky. Osobní zkušenost: Meduňka je výborná pro večerní popíjení, ať už samotná nebo ve směsi s lípou, trochou máty, zavinutkou, šantou kočičí citronovou. |
| Mentha cf. Spicata Jahodová | | veg | 60 | bílорůžový | 7.-8. | | | ano | | | | | |
| Mentha gracilis Ginger | máta (zázvorová) | veg | 60 | růžový | VII.-VIII. | s | | ano | ano | ano | | | Máta je jednou z nejdůležitějších aromatických rostlin na světě, které jsou pěstovány komerčně. Současná farmacie a lidové léčitelství využívá mátu na léčbu trávicího traktu (nechutenství, nadýmání, nemoci střev, žlučníku), jako antivirový a antibakteriální prostředek, proti bolestem hlavy, nachlazení. Široké uplatnění nachází mátová silice v kosmetickém průmyslu (ústní vody, zubní pasty, parfémy, mýdla) a tabákový průmysl při výrobě mentolových cigaret. V potravinářství je aroma mentolu použito v cukrovinkách a nápojích. Mátové listy jsou součástí čajových směsí, jsou vhodné jako koření zejména k pokrmům z jehněčího masa, zeleniny, do omáček. Také jeden z neznámějších míchaných nápojů Mojito se bez čerstvých listů máty neobejde. Z uvedeného vyplývá, že máta je základní léčivou a kulínářskou bylinkou, mnohdy může plnit také účel rostliny okrasné a proto by neměla chybět na žádné zahradě. Pozor! Odnožuje silně a může být i zaplevelující. Snadno pěstovatelná v nádobách. |










trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|------|--|--------------|------------|-----|--|--|-----|---|-----|-----|--|------|--|
| Mentha piperita Granada | máta (pomerančová) | veg | 60 | | růžový | VII.-VIII. | s | | | ano | o | ano | | | 5-8 | Máta je jednou z nejdůležitějších aromatických rostlin na světě, které jsou pěstovány komerčně. Současná farmacie a lidové léčitelství využívá mátu na léčbu trávicího traktu (nechutenství, nadýmání, nemoci střev, žlučníku), jako antivirový a antibakteriální prostředek, proti bolestem hlavy, nachlazení. Široké uplatnění nachází mátová silice v kosmetickém průmyslu (ústní vody, zubní pasty, parfémy, mýdla) a tabákový průmysl při výrobě mentolových cigaret. V potravinářství je aroma mentolu použito v cukrovinkách a nápojích. Mátové listy jsou součástí čajových směsí, jsou vhodné jako koření zejména k pokrmům z jehněčího masa, zeleniny, do omáček. Také jeden z neznámějších míchaných nápojů Mojito se bez čerstvých listů máty neobejde. Z uvedeného vyplývá, že máta je základní léčivou a kulinářskou bylinkou, mnohdy může plnit také účel rostliny okrasné a proto by neměla chybět na žádné zahradě. Pozor! Odnožuje silně a může být i zaplevelující. Snadno pěstovatelná v nádobách. |
| Mentha piperita Chocolate | | veg | 0,5 | | růžový | 7.-8. | | | | ano | | | | | | |
| Mentha spicata Maroccan | | veg | 0,6m | | | 7.-8. | | | | ano | | | | | | |
| Monarda Didyma Panorama Red Shades | zavinutka, monarda | | 80 | | červený | VII.-IX. | s | | | ano | o | ano | řez | | 5-7 | Indiáni požívali zavinutku k léčení nemocí horních cest dýchacích. Osobně ji používáme i jako náhradu čaje – samotnou nebo ve směsi například s meduňkou, šantou kočičí citronovou, mátou, možno trochu lípy, agastache anýzové. |
| Monarda fistulosa 'Gardenview Scarlet' | zavinutka, monarda | | 100 | | červený | VII.-X. | s | | | ano | o | ano | řez | | 5-7 | Osobně ji používáme i jako náhradu čaje – samotnou nebo ve směsi například s meduňkou, šantou kočičí citronovou, mátou, možno trochu lípy, agastache anýzové. Tento konkrétní kultivar nás překvapil úžasnou rozpínavostí, schopností obsadit v relativně krátké době nehlídané sousední území. Na podzim (po jarní výsadbě) se původní rostlina nedala odstranit jako jednotlivec, jen jako celá masa asi 5-10 cm vysoká o obsahu asi třetiny m ² . |
| Myrtus communis | myrta obecná | | | | bílý | | s | | | | | | řez | | | Zimovat nutno v nepromrzajícím prostoru. |
| Nepeta cataria ssp. Citriodora | šanta kočičí, citronová | | 70 | | bílý | VI.-IX. | s | | | ano | o | ano | | | 5-7 | Novinka u nás v roce 2014. Semena jsem dostali od kolegů z Květinového lahůdkářství. Pro nás objev roku v kategorii „aromatická rostlina“. Použitelná pro čaj samotná nebo ve směsi s jinými citronovými bylinami (s meduňkou, verbenou citronovou, citronovou trávou) nebo se zavinutkou, případně s mátou. Samotná má velmi výraznou citronovou vůni. |
| Nepeta faassenii Walker 's Low | | veg | 0,5 | | modrofialový | 6.-9. | | | | | | | | | | |
| Nepeta racemosa Alba | šanta | | 40 | | bílý | VI.-VIII. | s | | | | o | | | | 5-7 | |
| Omphalodes verna | pupkovec | veg | 20 | | modrý | IV.-V. | P-t | | | | | | | | 8-12 | V polostínu a na stanovišti s dostatkem vláhy vitální druh, který pokrývá půdu. Kveté brzy na jaře pomněnkově modrými květy. Vhodný například v kombinaci s hostami, se srdcovkou, s japonskými sasankami. |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|----|--|---|------------|-----|--|--|-----|---------|--|-----|------|--|
| Origanum vulgare | dobromysl obecná | gen | 60 | | růžový | VII.-VIII. | s | | | ano | an o | | | 7-9 | ookasivami, působí protizánětlivě na sliznice, upravují trávení, zvyšují vylučování žluče, uklidňují. Dle J.A.Zentricha lze dobromyslu také použít při žaludečních a střevních chorobách (zánětech), při žaludečních neurózách (uklidňuje), jako mírné antidepresivum, při poruchách spánku, při epilepsii, dále droga podporuje jaterní činnost, reguluje menstruaci, snižuje revmatické bolesti, působí potopudně a močopudně, prohlubuje sílu srdečního stahu, takže ji lze jako pomocnou drogu použít při angíně pectoris či při srdeční ischemii, jako kloktadlo ji lze použít při zánětu dásní nebo při onemocněních krčních. Inhalace dobromyslových par se osvědčila při kašli a rýmě, ale i jako prostředek potlačující migrenózní bolesti hlavy. Dobromysl nemá vedlejších účinků, takže se může podávat i dlouhodobě. Jak už název rostliny napovídá, droga příznivě působí na psychiku, čehož lze využít zejména v prevenci. Preventivně lze dobromysl také užívat při žaludečních neurózách a to nejlépe v kombinaci s meduňkou, třezalkou a hořcem nebo puškvorcem (v poměru 2:1:1:1/2) nebo zejména v zimním období je vhodné drogu přidávat do tzv. prsních čajů. |
| Origanum Wilder Majoran | | veg | 25 | | růžový | 7.-9. | | | | ano | | | | | |
| Paeonia lactiflora cf. Karl Rosenfield | pivoňka čínská | veg | 90 | | růžový | V.-VI. | s | | | | | | řez | 2-3 | Poloplný květ |
| Paeonia lactiflora cf. Lady Anna | | veg | 90 | | růžový plný, světlejší lístky uvnitř květu | 5.-6. | | | | | | | | | |
| Paeonia lactiflora kv. | pivoňka čínská | veg | 90 | | růžový | V.-VI. | s | | | | | | řez | 2-3 | květ plný, světlejší lístky uvnitř |
| Paeonia officinalis Rubra Plena | | veg | 70 | | tmavěč ervený, plný | 5 | | | | | | | | | |
| Pachysandra terminalis | tlustonitník | veg | 30 | | bílý | IV.-V. | P-t | | | | | | | 8-12 | |
| Pachysandra terminalis Green Carpet | tlustonitník | veg | 30 | | bílý | IV.-V. | P-t | | | | | | | 8-12 | |
| Papaver nudicaule Garden Gnome | | gen | 30 | | bílý, žlutý, oranžov ý | 7-8 | | | | | | | | | krátkodobá trvalka, přesévá se |
| Papaver orientale Nana Allegro | mák východní | | 50 | | červený | V.-VI. | s | | | | | | řez | 7-9 | Zatahuje v srpnu, raší na podzim, dobrý s pozdě rašícími trvalkami – Aster, Hemerocallis |
| Penstemon mexicalii Carillo Red | | gen | 30 | | červený | 6-9 | | | | | | | | | |
| Persicaria affinis Dimity | | veg | 35 | | červeno růžový | 7.-10. | | | | | | | | | |
| Phlomis russeliana | | gen | 10 | | žlutý | 6.-8. | | | | | | | | | |
| Phlomis tuberosa | | gen | 10 | | fialový | 6.-8. | | | | | | | | | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----|-------|---|---|-----------|-----|--|--|---------|--|-----|------|--|
| Phlox Zigeunerblut | flox | | 5 |  | červený | IV.-V. | s | | | | | | 9-12 | |
| Phlox paniculata cf. Fujiyama | flox, plamenka | veg | 90 | | bílý | VIII.-IX. | S-p | | | | | řez | 8 | Výborný pozdní flox. Netrpí houbovými chorobami. Při odstranění vrcholového květenství hned při odkvětu stihnou dokvést i postranní květenství. |
| Phlox paniculata Red Ridding Hood | | veg | 70 |  | červený | 7.-8. | s | | | | | | | |
| Phlox stolonifera Home Fires | | veg | 30 | | růžový | 5 | S-p | | | | | | | |
| Phlox subulata | flox | veg | 10 |  | růžový | IV.-V. | s | | | | | | 8-10 | |
| Phlox subulata | flox | veg | 10 |  | modrofíalový | IV.-V. | s | | | | | | 8-10 | |
| Phlox subulata cf. Candy Stripes | flox | veg | 10 |  | růžový | IV.-V. | s | | | | | | 8-10 | |
| Physostegia virginiana Crown of Snow | řetězovka virginská | gen | 80 | | bílý | VIII.-IX. | s | | | an o | | řez | 5-7 | Méně známá trvalka, Vitální, vhodná i k řezu. |
| Pimpinella saxifraga ssp. Saxifraga | | gen | 70 | | bílý | 7-8 | s | | | ano | | | | |
| Platycodon grandiflorus | boubelka velkokvětá | | 40 |  | modrý | VII.-IX. | s | | | | | | 9-12 | Velké zvonkovité květy, modrá nebo bílá barva. |
| Platycodon grandiflorus kv. | boubelka velkokvětá | gen | 30 | | bílý | VII.-IX. | s | | | | | | 9-12 | |
| Podophylum hexandrum | | gen | 40 | | růžový | 5 | | | | | | | | |
| Polemonium caeruleum | | gen | 760 | | bílý | 6.-7. | | | | | | | | |
| Polygonatum hybr. Weihenstephan | kokořík | veg | 90 | | bílý | V. | P-t | | | | | řez | 7 | rozvíjejí stonky s listy, v květnu kvetou níčí zelenobílé květy na obloukovitě přehnutých stoncích. Celá rostlina je vysoká do 1m. V polostínu je list zelený do podzimu, na plném slunci žlutne dřívě. Výborný podrost v lehkém stínu. Rostlina zpočátku pomalejší, potom velice vytrvalá. Odnožuje, nezapleveluje. |
| Polypodium vulgare | osladič obecný | veg | 25 | | | | P-t | | | | | | 12 | Domácí kapradina ze skal ve stínu. List stálezelený. Kořen sladký. |
| Potentilla crantzii Goldrausch | | veg | 10 |  | žlutý | 5-7 | | | | | | | | Kvete velice dlouho, květ zářivý. |
| Potentilla tridentata Nuuk | mochna | veg | 25 | | bílý | V.-VIII. | S-t | | | | | | 9 | |
| Primula beesiana | | gen | 20/60 |  | růžovoče rvený, patrovité květenství | 6-8 | | | | | | | | |
| Primula bulleyana | | gen | 20/60 |  | žlutooran žový, patrovité květenství | 6-8 | | | | | | | | |


















































trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|-----|----------------------|---------|-----|---------------------|--|-----|-----|-----|------|---|--|
| Primula denticulata | prvosenka zoubkatá | gen | 25 | fialový | IV.-V. | S-p | | | | | řez | 12 | Vděčná prvosenka pro slunce a polostín, pro půdy dobře zásobené vodou. Brzy na jaře kvete v kulatých květenstvích, většinou fialověmodrých, některé rostliny kvetou bíle. Konkrétní nabízený taxon je výsevem našeho domácího (ze zahradnických prvosenek) osiva. U nás se přesévá a roste porůznu poblíž původního místa výsadby už skoro 20 let. Neorganizovaná a vytrvalá. | |
| Prunella vulgaris | | gen | 30 | modrý | 6.-9. | | | | ano | | | | | |
| Pulmonaria cf. Reginald Kaye | | veg | 30 | modrofialový, růžový | 4-5 | | | | | | | | | |
| Pulmonaria saccharata Opal | | veg | 25 | modrý | 4-5 | | | | | | | | | |
| Pulsatilla grandis | koniklec velkokvětý | gen | 20 | modrý | IV. | s | | | | | | 9-12 | Původní druh z jižní Moravy. Světlemodrofialové květy brzy na jaře. Pak chomáče chlupatých semen. Jedna z prvních jarních radostí. | |
| Pulsatilla sp., směs barev | koniklec | gen | 20 | fialový | IV. | s | | | | | | 9-12 | | |
| Pycnanthemum pilosum | | gen | 80 | bílý | 8-10 | | | | | | | | | |
| Rheum rhabarbarum | | gen | 110 | bílý | 5-6 | | | | ano | | | | | |
| Rozmarinus officinalis | rozmarýn | veg | | modrý | | s | | | ano | ano | řez | | | |
| Rudbeckia f. Var. Sullivantii Goldsturm | rudbekie, třapatka lesklá | gen | 80 | žlutý | VII.-X. | s | | | | ano | | řez | 8 | Módní trvalka. Kvete zářivě od července do zámrazu. Pro plné slunce. Pro brzké jaro možno doplnit ranými cibulnatými a hlíznatými rostlinami – krokusy, tulipány, narcisy. |
| Rudbeckia fulgida | rudbekie, třapatka lesklá | gen | 80 | žlutý | VII.-X. | s | | | | ano | | řez | 8 | Jméno kultivaru neznáme, ale rostlina nás přesvědčila o své kvalitě, tak ji dále množíme. Není méně kvalitní než Rudbeckia fulgida var. Sullivantii Goldsturm, jen jiná. |
| Ruta graveolens | routa vonná | gen | 60 | žlutý | | s | FR1-2, GR1-2, FS1-2 | | | | | | 8 | Na zimu lehce krýt chvojem. Droga příznivě ovlivňuje činnost žlučníku, tlumí bolesti při žlučnickových kamenech, působí protikřečově (např. při ledvinových kolikách), močopudně, zvyšuje přívod krve do trávicího ústrojí (=zlepšuje trávení) a hladkého svalstva vůbec, zlepšuje prokrvení ledvin, mírně snižuje krevní tlak (zejména je-li vysoký tlak způsoben poruchami funkce ledvin), působí antiskeroticky, zpevňuje cévy (takže ji lze použít zejména při lámavosti cév nebo např. při krvácení do oční sítnice), zvyšuje tonus dělohy, při neurotických bolestech hlavy spojených se závratěmi působí sedativně, zevně ve formě obkladů nebo koupelí přispívá k hojení hnisajících ran, dříve byla užívána i proti střevním parazitům (hlístům). Routa se podává nejčastěji ve formě tinktury, případně ve formě čaje, nálevu (1 čajová lžička drogy na 1/2 l vody, nechá se 8 hodin luhovat) nebo v prášku (2x denně na špičku nože). Vzhledem k tomu, že routové silice jsou ve větších dávkách toxické, neměly by se v žádném případě překračovat doporučené dávky. Ve větším množství může routa vyvolat nevolnost, omámení a dávení, po požití čerstvé rostliny se může objevit zduření jazyka, nadměrné slinění nebo i střevní záněty. Navíc některé obsažené furanokumariny mají fotosenzibilizující účinek, takže mohou u citlivých osob vyvolat kožní záněty. V žádném případě by routa neměla být podávána těhotným ženám, neboť zvyšuje tonus dělohy a prokrvení malé pánve. Informace v tomto odstavci převážně převzaty z: J. Janča, J.A.Zentrich: Herbář léčivých rostlin, díl 4. |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|----|--|-----------------------|------------|---|--|--|--|-----|--|-----|-----|--|--|--|--|--|
| Salvia argentea Artemis | | gen | 70 | | bílý | 6.-8. | | | | | | | | | | | | | |
| Salvia nemorosa Caradonna | šalvěj hajní | | 70 | | modrý | VI.-VIII. | s | | | | | | řez | 8 | | | | | Vynikající odrůda. Fialové, výrazné květenství, pevné přímé stonky. Odolná vůči suchu. |
| Salvia nemorosa Schneehugel | | veg | 50 | | bílý | 6-7 | s | | | | | | | | | | | | |
| Salvia off. Berggarten | šalvěj lékařská | veg | 40 | | modrý | VI.-VII. | s | | | | ano | | řez | 5-7 | | | | | Širokolistá, vysoce hodnocená kulturní odrůda šalvěje lékařské. Odolná vůči suchu. |
| Salvia officinalis | šalvěj lékařská | gen | 50 | | modrý | VI.-VII. | s | | | | ano | | řez | 5-7 | | | | | |
| Salvia pratensis Rosa Rhapsody | | gen | 60 | | růžový | 6.-7. | | | | | | | | | | | | | |
| Sanquisorba hakusanensis | | gen | 70 | | růžový | 6. | | | | | | | | | | | | | |
| Santolina chamaecyparissus | | veg | 35 | | žlutý | 7.-8. | | | | | ano | | | | | | | | |
| Santolina pinnata | | veg | 35 | | žlutý | 7.-8. | | | | | ano | | | | | | | | |
| Satureja montana Bolero | | veg | 20 | | bílý | 7-8 | | | | | ano | | | | | | | | |
| Saxifraga umbrosa | | veg | 15 | | červeno bílý | 5-7 | | | | | | | | | | | | | |
| Scabiosa caucasica Perfecta Alba | hlaváč | gen | 60 | | bílý | VI.-IX. | s | | | | | | řez | 5-7 | | | | | |
| Sedum acre | | veg | 10 | | žlutý | 7.-8. | | | | | | | | | | | | | |
| Sedum album | rozchodník bílý | veg | 15 | | bílý | VI.-VIII. | s | | | | | | | | | | | | 16 |
| Sedum floriferum Weihenstephaner Gold | rozchodník | veg | 15 | | žlutý | VI.-VIII. | s | | | | | | | | | | | | 12 |
| Sedum reflexum | | veg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedum spurium, kv. | rozchodník | | 10 | | růžový | VII.-VIII. | s | | | | | | | | | | | | 12 |
| Sedum telephium Matrona | | veg | 60 | | růžovočervený, světlý | 8.-10. | | | | | | | | | | | | | |
| Sempervivum sp., 3 kultivary | netřesk | | 10 | | růžový | | s | | | | | | | | | | | | 15-20 |
| Stachys byzantina Silky Fleece | | gen. | 40 | | růžový | 6-9 | | | | | | | | | | | | | Chlupatý list |
| Stachys grandiflora (Betonica grandiflora) | čistec, | gen | 40 | | | V.-VI. | s | | | | | | řez | 8 | | | | | |
| Stachys monieri Hummelo | | veg | 60 | | růžový | 6-7 | | | | | | | | | | | | | |
| Stachys officinalis | | gen | 60 | | růžovořalový | 7.-8. | | | | | ano | | | | | | | | |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|-----|---|-----------------|------------|--|---|--|-----|--|--|-----|------|---|--|
| Symphytum grandiflorum Hidcote Blue | | veg | |  | modrý | 4.-5. |  |  | | | | | | | | |
| Telekia speciosa | kolotočník | gen | 110 |  | žlutý | VII.-IX. | S-p |  | | | | | řez | 2-3 | | |
| Teucrium hircanicum | ožanka | gen | 45 |  | fialový | VIII.-IX. | s |  | | | | | řez | 8 | | |
| Thalictrum aquilegifolium | | gen | 80 |  | růžový | 5.-6. | |  | | | | | | | | |
| Thalictrum delavayi | žluťucha | gen | 100 |  | růžový | VII.-VIII. | S-p |  | | | | | řez | 3-5 | | |
| Thymus citriodorus Aureus | | veg | 10 |  | | | |  | | | | | | | | |
| Thymus praecox | mateřídouška | veg | 5 |  | růžový | VII.-VIII. | s |  | | ano | | | | 9-12 | | |
| Thymus praecox kv. | mateřídouška | veg | 5 |  | bílý | VI.-VII. | s |  | | ano | | | | 9-12 | | |
| Thymus Purple Beauty | | veg | 10 |  | tmavě žový | 7-8 | |  | | | | | | | | |
| Thymus serpyllum | mateřídouška | gen | 10 |  | růžový | VII.-IX. | s |  | | ano | | | | 9-12 | | |
| Thymus vulgaris (tymián) | mateřídouška | gen | 20 |  | bílý | VI.-VII. | s |  | | ano | | | | 9-12 | | |
| Trifolium rubens | | gen | 60 |  | růžový | 6.-8. | |  | | | | | | | | |
| Trollius europaeus | mateřídouška | gen | 80 |  | žlutý | V. | s |  | | | | | řez | 8 | | |
| Trollius chinensis Golden Queen | úpolín | gen | 80 |  | oranžov ý | VII.-VIII. | s |  | | | | | řez | 7-9 | cena Award of Garden Merit (A.G.M.) Royal Horticultural Society | |
| Veronica spicata | rozrazil klasnatý | gen | 80 |  | modrý | VI.-VIII. | s |  | | | | | řez | 8 | | |
| Veronica spicata ssp. Incana | | gen | 60 |  | modrý | 7.-8. | |  | | | | | | | | |
| Veronicastrum sibiricum | rozrazil sibiřský | gen | 100 |  | světle modrý | VII.-VIII. | s |  | | | | | řez | 3-5 | | |
| Vinca minor | | veg | 15 |  | modrý | | |  | | | | | | | | |
| Vinca minor Variegata | barvínek | veg | 15 |  | modrý | IV.-V. | P-s |  | | | | | řez | 12 | Bíle skvrnitý list | |
| Viola labradorica | | gen | 15 |  | | | |  | | | | | | | | |
| Viola sororia Albiflora | violka | gen | 15 |  | bílý | IV.-V. | S-p |  | | | | | | 16 | | |
| Waldsteinia geoides | | veg | 20 |  | žlutý | 4.-5. | |  | | | | | | | | |
| Waldsteinia ternata | mochnička trojčetná | veg | 15 |  | žlutý | III.-IV. | P-t |  | | | | | | 12 | | |
| Yucca filamentosa | juka | veg | 130 |  | bílý | VII.-VIII. | s |  | | | | | řez | s-3 | | |

Okrasné trávy

trvalky a okrasné trávy

| název latinsky | název česky | výška v době květu (cm) | Převládající barva květu | barva květu | doba květu | nároky na světlo s-slunce, p-polostín, t-tmavý stín | | | | k řezu, do vázy, doplňková zeleň | ks/m2 | poznámka |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------|---|--|--|--|----------------------------------|-------|---|
| Avena (Helictotrichon) sempervirens | ovsík stálezelený | 120 | | zelený | VI.-VII. | s | | | | řez | 3-5 | |
| Carex brevicolis | ostřice | 30 | | hnědý | IV. | p | | | | řez | 7 | stálezelený |
| Carex digitata | ostřice | 25 | | | | P-t | | | | | 12 | |
| Carex grayi | ostřice Grayova | 70 | | zelený | | S-p | | | | řez | 8 | |
| Carex morrowii Ice Dance | ostřice japonská | 40 | | | | P-t | | | | | 8 | světlý pruh na okraji listu, výběžkatá! |
| Carex morrowii Variegata | ostřice japonská | 30 | | | | P-t | | | | | 8 | žlutý okraj listu |
| Carex muskingumensis | ostřice muskingumenská | 90 | | zelený | | S-p | | | | řez | 5-7 | |
| Carex muskingumensis Little Midge | ostřice muskingumenská | 40 | | | | S-p | | | | | 8-10 | |
| Carex pendula | ostřice převislá | 70 | | hnědý | | P-t | | | | řez | 1-2 | |
| Carex Red Rooster | ostřice | 60 | | | | s | | | | | 8 | hnědočervený list |
| Deschampsia caespitosa | metlice trsnatá | 70 | | zelený, | V.-VII. | S-p | | | | řez | 5-7 | |
| Deschampsia caespitosa Gold Tau | metlice trsnatá | 40 | | žlutozelený | VI.-VII. | S-p | | | | řez | 5-7 | |
| Festuca glauca Blue Select | kostřava sivá | 25 | | | V.-VI. | s | | | | | 9-12 | modrošedý list |
| Hakonechloa macra Aureola | | 40 | | | | P-t | | | | řez | 9-12 | podélně žlutě pruhovaný list |
| Luzula nivea | bika sněžná | 70 | | bílý | V.-VI. | P-t | | | | řez | 9-12 | |
| Luzula sylvatica | bika lesní | 60 | | hnědý | | P-t | | | | řez | 8 | stálezelený, lesklý |
| Miscanthus giganteus (M. Floridulus) | ozdobnice velká | 190 | | | | s | | | | řez | 1-2 | výběžkatý, nekvete |

trvalky a okrasné trávy

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|--|------------------|-----------|-----|--|--|--|--|-----|-----|-------------------------|
| Miscanthus sin. Kleine Silberspinne | Ozdobnice čínská | 120 | | bronzový | VIII.-IX. | s | | | | | řez | 3-4 | |
| Miscanthus sin. Morning Light | Ozdobnice čínská | 110 | | | | s | | | | | řez | 3-4 | zde nekvete |
| Miscanthus sin. Nippon | Ozdobnice čínská | 160 | | bronzový | IX | s | | | | | řez | 1-2 | |
| Miscanthus sin. Silberspinne | Ozdobnice čínská | 130 | | bronzový | IX. | s | | | | | řez | 3-4 | |
| Miscanthus sinensis Strictus | Ozdobnice čínská | 180 | | | | s | | | | | řez | 1-2 | |
| Panicum virg. Heavy Metal | proso prutnaté | 120 | | modrozelený | VIII.-IX | s | | | | | řez | 3 | modrozelený list |
| Panicum virgatum Squaw | proso prutnaté | 90 | | zelený | VIII.-IX. | s | | | | | řez | 3 | |
| Pennisetum alopecuroides (P. Compressum) | dochan psárkovitý | 70 | | zelený | | s | | | | | řez | 2-3 | |
| Pennisetum alop. var. Viridescens | dochan psárkovitý | 70 | | červeno hnědý | X. | s | | | | | řez | 2-3 | |
| Sesleria albicans | pěchava vápnomilná | 25 | | | III.-V. | s | | | | | | 8 | |
| Spodiopogon sibiricus | | 130 | | hnědý | IX.-X. | S-p | | | | | řez | 3-5 | |
| Spodiopogon sibiricus | | 130 | | hnědý | IX., X. | S-p | | | | | řez | 3-5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bambusy | | | | | | | | | | | | | |
| Fargesia nitida | | 300 | | | | S-p | | | | | | | trsnatý |
| Fargesia jiuzhaigou | | 300 | | | | S-p | | | | | | | trsnatý |
| Fargesia murilae Simba | | 300 | | | | S-p | | | | | | | trsnatý |
| Phyllostachys aureosulcata Aureocaulis | | 350 | | | | S-p | | | | | | | výběžkatý, žlutá stébla |